

آنفلوآنزای نوع A چیست؟

آنفلوآنزای نوع A یک بیماری تنفسی در میان خوک‌ها بوده است که توسط ویروس آنفلوآنزای H1N1 وجود می‌آید و باعث طفیان در آنها می‌گردد. این ویروس بعد از انتقال به انسان و تغییرات ژنتیکی در انسان تولید بیماری کرده و می‌تواند از انسان به انسان دیگر منتقل گردد.

علامت و نشانه‌های آنفلوآنزای نوع A در انسان چیست؟

نشانه‌های آنفلوآنزای نوع A در انسان، شبیه نشانه‌های آنفلوآنزای انسانی است و شامل: تب، سرفه، گلودرد، درد بدن، سر درد، لرز و خستگی است که در تعدادی از افراد اسهال و استفراغ نیز گزارش شده است. آنفلوآنزای نوع A همانند آنفلوآنزای انسانی باعث و خامت و تشید بیماری‌های مزمن می‌شود.

علامت خطر در بالغین که نیاز به مراقبت پزشکی دارد؟

تنفس سخت یا کوتاه کوتاه تنفس کردن، درد یا فشار در قفسه سینه یا شکم، سرگیجه ناگهانی، گیجی، استفراغ مداوم یا شدید

علامت خطر در کودکان که مراقبت پزشکی نیاز دارند:

تندد نفس کشیدن یا به زحمت نفس کشیدن، رنگ پوست مایل به آبی، کاهش سطح هوشیاری یا بیدار نشدن، وجود تحرک پذیری یا بیقراری، بهبود نشانه‌های آنفلوآنزا و عود بیماری با تب و لرز شدید.



چگونه عفونت آنفلوآنزای نوع A گسترش می‌یابد؟

گسترش ویروس H1N1 آنفلوآنزای نوع A از همان راههایی که آنفلوآنزای فصلی گسترش می‌یابد، اتفاق می‌افتد. (سرفه و عطسه فرد آلوده) بعضی از طریق تماس با سطوح آلوده به ویروس و سپس تماس با بینی و دهان آلوده می‌شوند.



مدت عفونت زائی یک فرد مبتلا به آنفلوآنزای نوع A

یک فرد مبتلا به آنفلوآنزای نوع A از یک روز قبل از شروع علائم تا ۷ روز و بیشتر به دنبال شروع بیماری می‌تواند دیگران را آلوده کند. بچه‌ها به ویژه نوجوانان می‌توانند در مدت طولانی تری مسری باشند. این مطلب بدین معنی است که امکان دارد قبل از اینکه فرد از بیماری خود آگاه باشد، دیگران را آلوده نماید.

چگونه عفونت انسانی آنفلوآنزای نوع A تشخیص داده می‌شود؟

برای تشخیص قطعی عفونت آنفلوآنزای نوع A جمع آوری نمونه تنفسی در ۴ تا ۵ روز اول بیماری و ارسال آن به آزمایشگاه برای تایید بیماری لازم می‌باشد.



آیا دارویی برای درمان آنفلوانزا ای نوع A وجود دارد؟

استفاده از استاتامیویر یا تامیفلو برای درمان موارد شدید عفونت با ویروس توصیه می شود.

داروهای ضد ویروسی داروهایی هستند ، که در مقابل بیماری توسط عدم تولید ویروس در بدن مبارزه می کند . داروهای ضد ویروسی اگر بالافاصله بعد از بیمار شدن (در مدت ۲ روز اول بروز نشانه ها) مصرف شود ، بهتر عمل می کنند و می توانند بیماری را خفیف سازد و فرد زوتر بهبود می یابد . داروهای ضد ویروسی همچنین از عوارض جدی آنفلوانزا جلو گیری می کند .

آیا واکسن برای پاندمی آنفلوانزا وجود دارد ؟

به دلیل اینکه ویروس جدید است واکسن آماده وجود ندارد و به حداقل ۶ تا ۱۲ ماه زمان جهت تولید لازم دارد . واکسن آنفلوانزا فصلی نیز در مقابل بیماری آنفلوانزا نوع A حفاظت نمی کند .

مدت زمان زنده ماندن ویروس خارج از بدن

تعدادی از ویروس ها و باکتری ها می توانند ۲ ساعت یا بیشتر روی سطوحی مانند دستگیره در ، میز و غیره زنده بمانند .

چه سطوحی بیشترین منبع آلودگی هستند ؟

قطرات تنفسی از طریق سرفه و عطسه فرد بیمار در هوا منتشر می شود و فرد سالم از طریق تماس با سطوح آلوده ای مانند میز ، اسباب بازی کودکان ، دستگیره در گوشی تلفن و سپس لمس بینی و دهان و چشم قبل از شستن دسها آلوده می شود .

راههای پیشگیری از ابتلاء به آنفلوانزا ای نوع A




- پوشاندن بینی و دهان با دستمال هنگام عطسه و سرفه و دور انداختن دستمال بعد از استفاده (در صورت نبود دستمال در داخل یقه یا چین آرنج لباس عطسه شود)
- شستن دست غالبا با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه
- اجتناب از تماس دست آلوده با چشم ، بینی و دهان
- اجتناب از تماس نزدیک با افراد بیمار

اقدامات لازم در صورت ابتلاء به آنفلوانزا ای نوع A

- در خانه ماندن و محدود کردن تماس با دیگران
- در صورت بروز هر یک از علائم خطر سریعا به پزشک مراجعه فرمایید .

بهترین روش شستن دست برای جلوگیری از بیماری

شستن دستها با آب و صابون به مدت ۱۵-۲۰ ثانیه (در صورت نبود آب و صابون با تمیز کننده های حاوی الکل یا ژل بهداشتی بشویید . در صورت استفاده از ژل دستها را به هم بمالید تا زمانیکه ژل خشک شود . ژل به آب احتیاج ندارد .)



نحوه تمیز کردن خانه ، لباسشویی و دفع زباله

- ✓ - دستمال و کلیه وسایل یکبار مصرف استفاده شده توسط فرد بیمار باید دفع شود . دستهایتان را پس از تماس با این وسایل بشویید .
- ✓ - سطوح را خصوصاً میز کنار تحت ، حمام ، دستشویی ، اسباب بازی ، گوشی تلفن ، دستگیره در را با گند زدا های خانگی تمیز کنید .
- ✓ - ظروف غذا خوری ، لباسها و ملحفه های بیماران نیاز به شستشو به صورت جداگانه ندارد اما باید توجه کرد که پیش از شستشو مورد استفاده قرار نگیرد .
- ✓ - از بغل کردن ملحفه و لباسهای کثیف برای جلوگیری از آلودگی پرهیزید .
- ✓ - بعد از حمل لباسهای کثیف ، ظروف غذا خوری بیمار دستها را با آب و صابون بشویید .

تهییه کننده : مه پاره حقی مقدم مسئول کنترل عفونت بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)